



CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, CONGIUNTO TRA AZIENDA USL DI IMOLA,
AZIENDA USL DI BOLOGNA, IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA
POLICLINICO DI SANT'ORSOLA E ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI, PER LA COPERTURA DI N.
4 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI

COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE – CAT. D.

PROVA PRATICA A

TIPO TEST 1



1. Nella pratica quotidiana , quando si indossano i guanti le mani devono essere lavate

- a. solo prima di indossarli
- b. prima di indossarli e dopo averli indossati
- c. solo se si è venuti a contatto con liquidi biologici

2. Il Sig. Bianchi, di 68 anni viene ricoverato in area medica per febbre ricorrente. Bianchi già da diversi anni è in cura con farmaci psicotropi. L'infermiere che prende in carico il paziente deve valutare il rischio di caduta. Si forniscano le motivazioni e quali fattori devono essere analizzati

- a. Si deve analizzare il rischio di cadute perché ha 68 anni ed è in cura con farmaci psicotropi, su prescrizione medica, ed è opportuno posizionare le sponde del letto per prevenire le eventuali cadute visto che il nuovo ambiente, in cui viene accolto il Paziente, potrebbe disorientarlo
- b. Si deve analizzare il rischio di cadute perché ha 68 anni ed è in cura con farmaci psicotropi. L'infermiere esegue la valutazione dell'ambiente in cui viene accolto il Paziente e deve valutare fattori legati al Paziente stesso, quali, ad esempio, deficit della memoria, eventuale incontinenza urinaria, precedenti cadute, paura di cadere
- c. Non è importante analizzare il rischio cadute

3. che tipologia di campione di urina è necessario prelevare per determinare un esame delle urine con strisce reagenti

- a. campione casuale
- b. campione sterile da catetere
- c. campione delle 24 ore

4. Nell'educazione ad un paziente in terapia con farmaci diuretici vanno fornite tutte le seguenti indicazioni tranne una: quale

- a. il farmaco va conservato in frigorifero
- b. in presenza di caldo intenso, riconoscere precocemente i segni e i sintomi di disidratazione
- c. i diuretici possono causare disturbi dell'equilibrio elettrolitico (per es,. crampi)

5. considerando i criteri generali per la gestione della terapia del dolore risulta importante somministrare i farmaci

- a. quando compare il dolore
- b. solo se il dolore è insopportabile
- c. prima che compaia il dolore



6. Procedura: Igiene e cura di colostomia a due pezzi. Indicare la corretta sequenza delle azioni

- Utilizzare garze o manopole in TNT pulite, inumidirle con acqua e procedere con movimenti circolari raccogliendo ed asportando le feci (1)
- Preparare tutto il materiale occorrente e deporlo sul carrello (2)
- Scoprire l'addome e disporre la traversa monouso assorbente al di sotto del bacino (3)
- Valutare la cute peristomale (4)
- a. 2-3-4-1
- b. 1-4-2-3
- c. 4-2-1-3

7. Quali sono le fasi del processo assistenziale secondo il modello dell'attività di vita

- a. Accertamento: raccolta di informazioni sul paziente rispetto alla situazione attuale nello svolgimento delle attività di vita. Individuazione dei problemi e delle loro motivazioni sotto forma di diagnosi infermieristica, esame delle risorse esistenti
- b. pianificazione e Valutazione: stabilire gli obiettivi da raggiungere, porre le scadenze, formulare piani d'azione, verificare i risultati del processo di assistenza e controllare che tutte le fasi si siano svolte secondo le modalità previste
- c. tutte le precedenti

8. se ricompare il polso durante la rianimazione cardiopolmonare è corretto

- a. valutare se la persona è cosciente
- b. valutare la presenza del respiro spontaneo
- c. valutare il cavo orale per la presenza di corpi estranei

9. quali sono le posizioni che è necessario fare assumere al paziente per promuovere l'espansione polmonare, in quanto riducono la pressione esercitata dall'addome sul diaframma per forza di gravità

- a. posizione prona
- b. posizione di Fowler o Semi Fowler
- c. posizione supina

10. quale fra i seguenti dati, raccolti durante l'accertamento infermieristico, è un dato oggettivo

- a. il valore della pressione arteriosa è 140/80 mmHg
- b. mi sento soffocare quando mi sdraio
- c. ho un forte mal di testa la sera



CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, CONGIUNTO TRA AZIENDA USL DI IMOLA,
AZIENDA USL DI BOLOGNA, IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA
POLICLINICO DI SANT'ORSOLA E ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI, PER LA COPERTURA DI N.
4 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI

COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE – CAT. D.

PROVA PRATICA A

TIPO TEST 2



1. che tipologia di campione di urina è necessario prelevare per determinare un esame delle urine con strisce reagenti

- a. campione casuale
- b. campione sterile da catetere
- c. campione delle 24 ore

2. quali sono le posizioni che è necessario fare assumere al paziente per promuovere l'espansione polmonare, in quanto riducono la pressione esercitata dall'addome sul diaframma per forza di gravità

- a. posizione prona
- b. posizione di Fowler o Semi Fowler
- c. posizione supina

3. Il Sig. Bianchi, di 68 anni viene ricoverato in area medica per febbre ricorrente. Bianchi già da diversi anni è in cura con farmaci psicotropi. L'infermiere che prende in carico il paziente deve valutare il rischio di caduta. Si forniscano le motivazioni e quali fattori devono essere analizzati

- a. Si deve analizzare il rischio di cadute perché ha 68 anni ed è in cura con farmaci psicotropi, su prescrizione medica, ed è opportuno posizionare le sponde del letto per prevenire le eventuali cadute visto che il nuovo ambiente, in cui viene accolto il Paziente, potrebbe disorientarlo
- b. Si deve analizzare il rischio di cadute perché ha 68 anni ed è in cura con farmaci psicotropi. L'infermiere esegue la valutazione dell'ambiente in cui viene accolto il Paziente e deve valutare fattori legati al Paziente stesso, quali, ad esempio, deficit della memoria, eventuale incontinenza urinaria, precedenti cadute, paura di cadere
- c. Non è importante analizzare il rischio cadute

4. considerando i criteri generali per la gestione della terapia del dolore risulta importante somministrare i farmaci

- a. quando compare il dolore
- b. solo se il dolore è insopportabile
- c. prima che compaia il dolore

5. Nella pratica quotidiana , quando si indossano i guanti le mani devono essere lavate

- a. solo prima di indossarli
- b. prima di indossarli e dopo averli indossati
- c. solo se si è venuti a contatto con liquidi biologici



6. Nell'educazione ad un paziente in terapia con farmaci diuretici vanno fornite tutte le seguenti indicazioni tranne una: quale

- a. il farmaco va conservato in frigorifero
- b. in presenza di caldo intenso, riconoscere precocemente i segni e i sintomi di disidratazione
- c. i diuretici possono causare disturbi dell'equilibrio elettrolitico (per es,. crampi)

7. Procedura: Igiene e cura di colostomia a due pezzi. Indicare la corretta sequenza della azioni

- Utilizzare garze o manopole in TNT pulite, inumidirle con acqua e procedere con movimenti circolari raccogliendo ed asportando le feci (1)
 - Preparare tutto il materiale occorrente e deporlo sul carrello (2)
 - Scoprire l'addome e disporre la traversa monouso assorbente al di sotto del bacino (3)
 - Valutare la cute peristomale (4)
- a. 2-3-4-1
 - b. 1-4-2-3
 - c. 4-2-1-3

8. se ricompare il polso durante la rianimazione cardiopolmonare è corretto

- a. valutare se la persona è cosciente
- b. valutare la presenza del respiro spontaneo
- c. valutare il cavo orale per la presenza di corpi estranei

9. quale fra i seguenti dati, raccolti durante l'accertamento infermieristico, è un dato oggettivo

- a. il valore della pressione arteriosa è 140/80 mmHg
- b. mi sento soffocare quando mi sdraio
- c. ho un forte mal di testa la sera

10. Quali sono le fasi del processo assistenziale secondo il modello dell'attività di vita

- a. Accertamento: raccolta di informazioni sul paziente rispetto alla situazione attuale nello svolgimento delle attività di vita. Individuazione dei problemi e delle loro motivazioni sotto forma di diagnosi infermieristica, esame delle risorse esistenti
- b. pianificazione e Valutazione: stabilire gli obiettivi da raggiungere, porre le scadenze, formulare piani d'azione, verificare i risultati del processo di assistenza e controllare che tutte le fasi si siano svolte secondo le modalità previste
- c. tutte le precedenti



CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, CONGIUNTO TRA AZIENDA USL DI IMOLA,
AZIENDA USL DI BOLOGNA, IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA
POLICLINICO DI SANT'ORSOLA E ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI, PER LA COPERTURA DI N.
4 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI

COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE – CAT. D.

PROVA PRATICA A

TIPO TEST 3

Handwritten signature and initials



1. se ricompare il polso durante la rianimazione cardiopolmonare è corretto

- a. valutare se la persona è cosciente
- b. valutare la presenza del respiro spontaneo
- c. valutare il cavo orale per la presenza di corpi estranei

2. considerando i criteri generali per la gestione della terapia del dolore risulta importante somministrare i farmaci

- a. quando compare il dolore
- b. solo se il dolore è insopportabile
- c. prima che compaia il dolore

3. quali sono le posizioni che è necessario fare assumere al paziente per promuovere l'espansione polmonare, in quanto riducono la pressione esercitata dall'addome sul diaframma per forza di gravità

- a. posizione prona
- b. posizione di Fowler o Semi Fowler
- c. posizione supina

4. Nella pratica quotidiana , quando si indossano i guanti le mani devono essere lavate

- a. solo prima di indossarli
- b. prima di indossarli e dopo averli indossati
- c. solo se si è venuti a contatto con liquidi biologici

5. Quali sono le fasi del processo assistenziale secondo il modello dell'attività di vita

- a. Accertamento: raccolta di informazioni sul paziente rispetto alla situazione attuale nello svolgimento delle attività di vita. Individuazione dei problemi e delle loro motivazioni sotto forma di diagnosi infermieristica, esame delle risorse esistenti
- b. pianificazione e Valutazione: stabilire gli obiettivi da raggiungere, porre le scadenze, formulare piani d'azione, verificare i risultati del processo di assistenza e controllare che tutte le fasi si siano svolte secondo le modalità previste
- c. tutte le precedenti

6. Nell'educazione ad un paziente in terapia con farmaci diuretici vanno fornite tutte le seguenti indicazioni tranne una: quale

- a. il farmaco va conservato in frigorifero
- b. in presenza di caldo intenso, riconoscere precocemente i segni e i sintomi di disidratazione
- c. i diuretici possono causare disturbi dell'equilibrio elettrolitico (per es., crampi)

Handwritten signature and scribbles at the bottom right of the page.



7. che tipologia di campione di urina è necessario prelevare per determinare un esame delle urine con strisce reagenti

- a. campione casuale
- b. campione sterile da catetere
- c. campione delle 24 ore

8. Procedura: Igiene e cura di colostomia a due pezzi. Indicare la corretta sequenza della azioni

- Utilizzare garze o manopole in TNT pulite, inumidirle con acqua e procedere con movimenti circolari raccogliendo ed asportando le feci (1)
 - Preparare tutto il materiale occorrente e deporlo sul carrello (2)
 - Scoprire l'addome e disporre la traversa monouso assorbente al di sotto del bacino (3)
 - Valutare la cute peristomale (4)
- a. 2-3-4-1
 - b. 1-4-2-3
 - c. 4-2-1-3

9. quale fra i seguenti dati, raccolti durante l'accertamento infermieristico, è un dato oggettivo

- a. il valore della pressione arteriosa è 140/80 mmHg
- b. mi sento soffocare quando mi sdraio
- c. ho un forte mal di testa la sera

10. Il Sig. Bianchi, di 68 anni viene ricoverato in area medica per febbre ricorrente. Bianchi già da diversi anni è in cura con farmaci psicotropi. L'infermiere che prende in carico il paziente deve valutare il rischio di caduta. Si forniscano le motivazioni e quali fattori devono essere analizzati

- a. Si deve analizzare il rischio di cadute perché ha 68 anni ed è in cura con farmaci psicotropi, su prescrizione medica, ed è opportuno posizionare le sponde del letto per prevenire le eventuali cadute visto che il nuovo ambiente, in cui viene accolto il Paziente, potrebbe disorientarlo
- b. Si deve analizzare il rischio di cadute perché ha 68 anni ed è in cura con farmaci psicotropi. L'infermiere esegue la valutazione dell'ambiente in cui viene accolto il Paziente e deve valutare fattori legati al Paziente stesso, quali, ad esempio, deficit della memoria, eventuale incontinenza urinaria, precedenti cadute, paura di cadere
- c. Non è importante analizzare il rischio cadute

