



CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, CONGIUNTO TRA AZIENDA USL DI IMOLA,  
AZIENDA USL DI BOLOGNA, IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA  
POLICLINICO DI SANT'ORSOLA E ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI, PER LA COPERTURA DI N.  
4 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI

**COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE – CAT. D.**

## PROVA PRATICA B

# TIPO TEST 1



### 1. il prelievo di campione di urina per analisi batteriologica va eseguito

- a. sul mitto iniziale
- b. sul mitto intermedio
- c. sul mitto terminale

### 2. Il Sig. Bianchi, di 68 anni viene ricoverato in area medica per febbre ricorrente. Bianchi già da diversi anni è in cura con farmaci psicotropi. L'infermiere che prende in carico il paziente deve valutare il rischio di caduta. Si forniscano le motivazioni e quali fattori devono essere analizzati

- a. Si deve analizzare il rischio di cadute perché ha 68 anni ed è in cura con farmaci psicotropi, su prescrizione medica, ed è opportuno posizionare le sponde del letto per prevenire le eventuali cadute visto che il nuovo ambiente, in cui viene accolto il Paziente, potrebbe disorientarlo
- b. Si deve analizzare il rischio di cadute perché ha 68 anni ed è in cura con farmaci psicotropi. L'infermiere esegue la valutazione dell'ambiente in cui viene accolto il Paziente e deve valutare fattori legati al Paziente stesso, quali, ad esempio, deficit della memoria, eventuale incontinenza urinaria, precedenti cadute, paura di cadere
- c. Non è importante analizzare il rischio cadute

### 3. a seguito dell'emanazione della legge 38/2010 la rilevazione del dolore

- a. è facoltativa
- b. rappresenta una buona pratica ma non un obbligo
- c. rappresenta un obbligo per il personale medico ed infermieristico

### 4. Un paziente anziano affetto da Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva viene ricoverato presso il servizio di Medicina per dispnea; il medico prescrive la somministrazione di ossigeno al 40% per 8 ore al giorno. Quale presidio utilizzerà l'infermiere per somministrare la terapia

- a. cannula nasale
- b. maschera facciale semplice
- c. maschera di Venturi

### 5. Procedura: Posizionamento del sondino naso gastrico. Indicare la corretta sequenza delle azioni

- Posizionare sul torace del paziente una traversa (1)
  - Verificare la prescrizione medica sulla documentazione clinica (2)
  - Proseguire nell'introduzione dirigendo il sondino posteriormente fino a raggiungere l'orofaringe (3)
  - Valutare la lunghezza del sondino da inserire (4)
- a. 4-2-1-3
  - b. 1-2-4-3
  - c. 2-1-4-3



**6. Il massaggio cardiaco nel bambino deve essere effettuato**

- a. circondando con le mani il torace e premendo sullo sterno con i pollici
- b. posizionando una mano con il palmo appoggiato sul terzo inferiore dello sterno
- c. collocando una mano sul terzo superiore dello sterno

**7. in un paziente sottoposto a terapia infusione venosa periferica si deve sospettare una tromboflebite se si nota**

- a. la presenza di soffiatura emorragica intorno alla sede di introduzione dell'ago
- b. la presenza di eritema bolloso intorno alla sede di introduzione dell'ago
- c. la presenza intorno alla sede di introduzione dell'ago di una tumefazione tesa, dolente, e arrossata

**8. per quanto riguarda la diagnosi Rischio di integrità cutanea compromessa, l'infermiere dovrà**

- a. illustrare al paziente come praticare un accurata igiene del cavo orale e verificare l'efficacia ad ogni accesso
- b. praticare un accurata igiene del cavo orale ad ogni accesso
- c. illustrare al paziente come praticare un accurata igiene del cavo orale ad ogni accesso

**9. quali sono i problemi più frequenti durante l'utilizzo delle pompe infusionali**

- a. reflusso ematico, pressione infusione insufficiente, riscaldamento dell'apparecchio
- b. ostruzione del sistema, presenza di aria all'interno del circuito, assenza di alimentazione elettrica
- c. ossidazione della batteria interna, reflusso ematico, riscaldamento dell'apparecchio

**10. In una paziente ricoverata con diagnosi di Gravidanza extrauterina l'assistenza è rivolta a**

- a. prevenire le complicanze posizionando la donna in posizione di Trendelenburg
- b. rilevare tempestivamente i segni di shock ipovolemico
- c. mantenere una rigorosa dieta iposodica

