

## Vaccinazione SARS-CoV-2 nei pazienti con Lupus Eritematoso Sistemico

### Domande

### Risposte

Sono affetto/a da Lupus Eritematoso Sistemico (LES), potrei presentare maggiori rischi di sviluppare una forma severa di COVID-19?

Al momento non sono disponibili dati definitivi, **tuttavia si può ipotizzare che i pazienti affetti da LES possano avere un rischio maggiore di sviluppare una forma severa di malattia**, specialmente quelli che assumono cronicamente steroidi, immunosoppressori e terapia biotecnologica (Rituximab).

Sono affetto/a da LES, dovrei sottopormi alla vaccinazione anti- SARS-CoV-2?

Anche se non sono ancora disponibili dati in merito alla efficacia e alla tollerabilità dei vaccini nei pazienti con LES, come anche per le pazienti gravide o che stanno allattando, **dai dati a disposizione emerge come il rischio di sviluppare una forma severa di COVID-19 sia superiore ad eventuali eventi avversi legati alla vaccinazione**, specialmente per i pazienti che assumono cronicamente steroidi, immunosoppressori e terapia biotecnologica (Rituximab).

Sono affetto/a da LES e sto assumendo idrossiclorochina, non è sufficiente questo farmaco per proteggermi dal COVID-19?

Tutti i pazienti con LES dovrebbero essere trattati (se non sussistono controindicazioni) con antimalarici (ad es. idrossiclorochina) in considerazione dei molteplici vantaggi connessi all'assunzione di questi farmaci. Tuttavia, sono in costante incremento le evidenze scientifiche che dimostrano come l'idrossiclorochina **non sia efficace nel prevenire o nel trattare l'infezione da COVID-19**.

Sono affetto/a da LES, è possibile una riacutizzazione della mia malattia dopo la vaccinazione anti-SARS-CoV-2?

Al momento non sono disponibili dati in merito all'utilizzo di questi vaccini. Tuttavia, basandosi sulle evidenze scientifiche disponibili in merito ad altri vaccini (es. influenza, anti-pneumococco), risulta poco probabile un aumento del rischio di sviluppare riacutizzazioni di malattia nei pazienti con una malattia in buon controllo.

Sono affetto/a da LES e dovrei iniziare terapia con farmaci immunosoppressori. Il mio sistema immunitario sarà in grado di sviluppare una risposta immunitaria adeguata ai vaccini anti- SARS-CoV-2?

**La vaccinazione dovrebbe essere proposta prima dell'inizio di terapia con farmaci immunosoppressori** (idealmente si dovrebbe iniziare tali farmaci almeno 2 settimane dopo la seconda dose del vaccino anti-SARS-CoV-2), quando questo sia possibile. La tempistica della vaccinazione e l'inizio di terapia con farmaci immunosoppressori è un argomento che dovrebbe essere discusso assieme al proprio Medico.

Sono affetto/a da LES e sto assumendo terapia immunosoppressiva. E' possibile che mi ammali di COVID19 come possibile effetto collaterale del vaccino?

**No, il vaccino attualmente utilizzato in Europa non può indurre infezione da COVID19.**

Sono affetto/a da LES e mi sto per vaccinare. Devo sospendere la mia abituale terapia per favorire l'effetto del vaccino?

In generale, **bisogna evitare di sospendere o diminuire i dosaggi della terapia abituale perché questo potrebbe provocare una riaccensione del LES**. Ad ogni modo è consigliabile discuterne col proprio Medico che può valutare ogni singola situazione

Sono affetto/a da LES, posso ricevere solo una dose del vaccino (per quelli che richiedono 2 dosi, es. Pfizer/BioNtech e Moderna)?

I dati preliminari sulla popolazione generale suggeriscono come, in coloro che abbiano ricevuto solo una dose invece delle due necessarie, **la protezione nei confronti dell'infezione da COVID19 sia ridotta**.

Sono affetto/a da LES e sono stato appena vaccinato, devo comunque indossare la mascherina e osservare il distanziamento sociale?

L'efficacia del vaccino anti-SARS-CoV-2 nei pazienti con LES, in particolare se in terapia immunosoppressiva, sembra inferiore rispetto alla popolazione generale. Pertanto, finché non si saprà di più sull'efficacia del vaccino, **il paziente con LES dovrà comunque indossare la mascherina ed osservare il distanziamento sociale**.